

Monitoreo y Anillamiento

El monitoreo de las poblaciones de anátidas es una herramienta muy útil para establecer nuevas áreas de conservación, medidas de manejo y restauración, y para determinar épocas y cupos de caza, de forma que ésta sea sostenible.

El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los EUA y el Servicio de Vida Silvestre de Canadá realizan monitoreos de anátidas desde los años 1950. Desde 1990 Wetlands International lleva a cabo “El Censo Neotropical de Aves Acuáticas” que incluye varios países de América del Sur. Por su parte, DU en colaboración con biólogos, ornitólogos y aficionados a las aves, comenzó los conteos de anátidas en el Caribe, América Central y América del Sur en 1999.

Desde 1900 en América del Norte se han colocado más de 18,4 millones de anillos en patos. De éstos, más de 10.000 han sido recuperados en América Latina y el Caribe. Al recuperar un anillo podemos saber la edad del pato, de dónde vino, y otra información importante. En América Latina y el Caribe sólo la Argentina, Brasil y Venezuela han anillado anátidas para proyectos específicos de investigación.

Los patos se anillan después de la reproducción, cuando los pichones y los adultos están “mancones” (pierden las plumas de sus alas y no pueden volar). Si usted encuentra un pato anillado, por favor envíe la información a la dirección del Servicio de Pesca y Vida de Silvestre de los EUA que se indica en el anillo, o por internet a:

<http://www.pwrc.usgs.gov/BBL/homepage/mailrecv.htm>

No es necesario enviar el anillo.

Monitoring and Banding

The monitoring of waterfowl populations is a very useful tool to identify new areas of conservation, establish measures for management and restoration, and define seasons and bag limits for sustainable hunting.

The US Fish and Wildlife Service and the Canadian Wildlife Service have performed waterfowl surveys since the 1950s. Wetlands International has carried out “The Neotropical Waterbird Census” in several countries in South America since 1990. For our part, DU, in collaboration with numerous biologists, ornithologists, and amateur bird watchers, initiated waterfowl surveys in the Caribbean, Central America, and northern South America in 1999.

Since 1900, more than 18.4 million ducks have been banded in North America. Of these, more than 10,000 have been recovered in Latin America and the Caribbean (LAC). Band recoveries can tell us about the age of the duck, where they came from, and other important information. In LAC, only Argentina, Brazil, and Venezuela have banded birds for specific research projects.

The ducks are banded after breeding, when the ducklings and adults are “flightless” (have lost the feathers on their wings and can not fly). If you find a banded bird, please send the band data to the USFWS address on the band, or submit it via the internet:

<http://www.pwrc.usgs.gov/BBL/homepage/mailrecv.htm>

You do not need to send the band.